615
М-294
3/13

ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ МИНУСИНСКАГО МѢСТНАГО МУЗЕЯ.

18788

КАТАЛОГЪ

народно-медицинскихъ средствъ, находящихся въ Музеѣ.

Составилъ Н. Мартьяновъ.

Доложено Обществу врачей Енисейской губ. на очередномъ засѣданіи 15 декабря 1892 года.

КРАСНОЯРСКЪ.
Типографія Ал. Д. Жилина.
1893.

Этнографическій Отдѣлъ Минусинскаго Мѣстнаго Музея,

12533/13

БИБЛИОТЕКА
Гос. Музея имени Н. М. Мартьянова
В ГОР. МИНУСИНСКЕ
Инв. № ~~18389~~ 21866

КАТАЛОГЪ

народно-медицинскихъ средствъ, находящихся въ Музеѣ.

СОСТАВИЛЪ

Н. МАРТЬЯНОВЪ.

Доложено Обществу врачей Енисейской губ. въ очередномъ засѣданіи 15 Декабря 1892 г.

КРАСНОЯРСКЪ.
Типографія Ал. Д. Жилина.
1893.

Матеріалъ по народной медицинѣ Минусинскаго края представленъ въ Минусинскомъ Музеѣ въ слѣдующихъ коллекціяхъ:

I. Предметы растительнаго происхожденія: травы, корни, плоды и другія части растенія въ сыромъ видѣ, т. е. засушенныя и сохраняются въ Музеѣ такъ, какъ они находились у знахарокъ. Большая часть этихъ предметовъ въ пучкахъ. Вся коллекція имѣетъ 186 №№, которые размѣщены въ Музеѣ въ глубокихъ открытыхъ бумажныхъ коробкахъ и банкахъ емкостью около фунта, въ порядкѣ русскаго алфавита.

II. Предметы изъ царства животныхъ—сырые и полуобработанные. Коллекція состоитъ изъ 10 нумеровъ.

III. Лѣкарственныя вещества минеральнаго происхожденія. Коллекція заключаетъ 14 предметовъ.

IV. Разные предметы, употребляемые въ народной медицинѣ, всего 7 нумеровъ.

V. Гербарій мѣстной флоры, заключающій полные экземпляры растеній, употребляемыхъ въ народной медицинѣ Минусинскаго края. Въ гербаріи 176 видовъ.

VI. Коллекція предметовъ немѣстнаго происхожденія, употребляемыхъ мѣстными жителями для лѣченія. Въ коллекцію вошли только общеизвѣстныя и популярныя въ народной медицинѣ вещества. Всего 46 предметовъ.

Народно-медицинскія средства, находящіяся въ употребленіи у жителей Минусинскаго округа, какъ у русскихъ, такъ и инородцевъ, начали собираться еще до основанія Музея, съ 1874 года, Н. М. Мартьяновымъ. Съ основаніемъ Музея въ его программу матеріаловъ по мѣстной этнографіи вошли и народно-медицинскія средства. Къ собиранію этого матеріала для Музея привлечены были, кромѣ сотрудниковъ, еще и торговцы, разъѣзжающіе по Минусинскому округу и доставляющіе въ Музей

археологическіе предметы. Особенно много доставили въ Музей изъ коллекторовъ этой категоріи — Кондратій Сѣмечкинъ, старовѣръ, и Н. П. Юхневичъ; первый — преимущественно изъ старовѣрческихъ деревень бывшей Абаканской и Тесинской волостей, а второй — изъ разныхъ мѣстъ округа. Непосредственно отъ деревенскихъ лѣкарокъ Музей пріобрѣлъ коллекцію отъ старухи Маріи Юрьевой изъ дер. Малой Минусы.

Изъ другихъ сотрудниковъ Музея весьма значительный матеріалъ и свѣдѣнія по народной медицинѣ собрали въ Сѣверо-Восточной части округа — В. О. Гандельсманнъ и жена его Татьяна Петровна, а также Агнія Григорьевна Олофинская. Отдѣльные предметы по народной медицинѣ поступили: отъ I А. Надеждинскаго, А. В. Малинина, Д. Городилова, Н. М. Ивановскаго, Дм. А. Клеменца и Ѳ. Ѳ. Девятова.

Коллекція народныхъ медицинскихъ средствъ Минусинскаго Мѣстнаго Музея[1].

Изъ Минусинскаго округа.

I. Растительнаго происхожденія.

1. *Алый перелой* (Dianthus superbus L.). Сем. Silenaceae. Отваръ всего растенія употребляется беременными женщинами отъ надсады и при боли въ животѣ. Абаканская волость.

Анненковъ. Ботаническій Словарь — 126.

2. *Арбузъ* (Cucumis Citrillus Seringe). Сем. Cucurbitaceae. Плоды употребляются какъ хорошее мочегонное и какъ средство отъ мужской грыжи (трипера). Разводится на бахчахъ.

3. *Арца* (Juniperus nana Willd). Сем. Coniferae. Ягоды

1) Коллекція хранится въ Этнографическомъ Отдѣлѣ Музея въ бумажныхъ открытыхъ глубокихъ коробкахъ и стеклянныхъ банкахъ, емкостью около фунта.

употребляются въ видѣ настоя и отвара отъ водянки; все растеніе для подкуриванія. Junip. nana мѣстные жители принимаютъ за обыкновенный можжевельникъ и употребляютъ вмѣсто послѣдняго.

4. *Бабушкина трава* (Scutellaria scordiifolia Fisch.). Сем. Labiatae. Въ видѣ настойки на водкѣ, какъ укрѣпляющее желудокъ и возбуждающее аппетитъ. Минусинскъ и другія мѣста округа. О близкомъ видѣ Sc. galericulata L. Анненковъ 1. с. 323 стр.

5. *Багульникъ* (Ledum palustre L.). Сем. Ericaceae. Употребляется при лѣченіи скота. Дер. Григорьевка.

Анненковъ — 189, Крыловъ Пермск. 25, Крыловъ Каз. 3, Словцовъ 174, Горницкій 95.

6. *Баданъ* (Saxifraga crassifolia L.). Сем. Saxifragaceae. Употребляется вмѣсто чая инородцами и русскими. Собираются только старые почернѣвшіе листья.

Анненковъ 317.

7. *Березовыя почки* отъ Betula alba L. Сем. Betulaceae. Спиртная настойка березовыхъ листовыхъ почекъ довольно употребительное средство, особенно снаружи для заживленія ранъ.

Анненковъ 64, Крыловъ Пермск. 27, Крыловъ Казанск. 5, Горницкій 34.

8. *Березовый мохъ* (Parmelia spec.). Растущій на корѣ березы, изъ класса Лишайниковъ. Въ видѣ отвара употребляютъ при кашлѣ. Дер. Мал. Ничка.

9. *Богородская трава* (Thymus serpyllum L.). Сем. Labiatae. Настой пьютъ отъ красной грыжи и друг. болѣзней. Довольно распространенное народно-медицинское средство. Идринская волость.

Анненковъ 355, Крыловъ Пермск. 28, Крыловъ Казанск. 6, Горницкій 167.

10. *Борецъ синій* (Aconitum Lycoctonum L.). Сем. Ranunculaceae. Въ видѣ настойки на водкѣ и водной наливки употребляется рюмками при ломотахъ, простудахъ и друг. про-

студныхъ болѣзняхъ. Довольно распространенное средство въ Минусинск. округѣ.

Крыловъ Пермск. 98, Крыловъ Казанск. 53.

11. *Борецъ* (Aconitum Napellus L., Aconitum volubile Pall.). Сем. Ranunculaceae. Внутрь въ видѣ настоя и отвара и настойки на водкѣ при ревматизмахъ и другихъ простудныхъ болѣзняхъ. Идринская, Абаканская волости и др. мѣста.

Анненковъ 7.

12. *Борецъ желтый*, мухоморъ (Aconitum Anthora L.). Сем. Ranunculaceae. Отъ нутра. Пьютъ въ видѣ настоя. Беременнымъ женщинамъ пить нельзя. Село Абаканское.

13. *Бузунъ-цвѣтъ* (Sambucus racemosa L.). Сем. Caprifoliaceae. Въ видѣ отвара изъ цвѣтовъ, какъ потогонное и при лихорадкахъ. М. Минуса.

Анненковъ 314.

14. *Бѣлоголовникъ* (Achillea ptarmica Linn.). Сем. Compositae. Отваръ отъ поноса и боли въ желудкѣ. Идринская волость.

Крыловъ Пермск. 40.

15. *Бѣлоголовникъ* (Spiraea Ulmaria Linn). Сем. Amygdaleae. Служитъ суррогатомъ чая у инородцевъ и русскихъ.

Анненковъ 340, Крыловъ Пермск. 63, Крыловъ Каз. 8, Словцовъ 117, Горницкій 160.

16. *Бѣлозеръ* (Parnassia palustris Linn.). Сем. Droseraceae. Употребляется въ видѣ отвара внутрь при женскихъ болѣзняхъ. Абаканская волость.

Анненковъ 242, Крыловъ Пермск. 75, Крыловъ Казанск. 47, Словцовъ 90, Горницкій 119.

17. *Бѣлый жабрей* (Lamium album Linn.). Сем. Labiatae. Отваръ отъ колотья, для припарокъ отъ килы. Дер. Б. Телекъ.

Анненковъ 184, Крыловъ Пермск. 31, Горницкій 92.

18. *Бѣлый зверобой* (Antennaria dioica Gartn.). Сем. Compositae. Отъ красной и бѣлой грыжи внутрь, въ видѣ отвара. Село Шушенское.

Анненковъ 37, Словцовъ 148, Горницкій 21.

19. *Бѣлый кипрей* (Epilobium angustifolium Linn.), съ бѣлыми цвѣтами. Сем. Onagrariae. Въ видѣ отвара отъ бѣлой горячки. Дер. Стар. Кныши.

Анненковъ 133, Крыловъ Перм. 55, Крыловъ Казанск. 30, Словцовъ 129.

20. *Бѣлый плакунъ* (Astragalus melilotoides Pall.). Сем. Leguminosae. Въ видѣ отвара даютъ дѣтямъ отъ испуга. Дер. М. Минуса.

21. *Волчье лыко, Волчьи ягоды* (Daphne Mezereum Linn.). Сем. Thymeleae. Кора употребляется при лѣченіи лошадей. Дер. Брагина и др. мѣста Минусинскаго округа.

Анненковъ 123, Крыловъ Пермск. 95, Крыловъ Казанск. 72, Словцовъ 210, Горницкій 63.

22. *Воробьиное сѣмя* (Lithospermum officinale Linn.). Сем. Borragineae. Все растеніе употребляется въ видѣ отвара внутрь отъ рѣзи въ животѣ и при запорахъ. Дер. Тагашетъ.

Анненковъ 197, Крыловъ Пермск. 36, Крыловъ Каз. 11.

23. *Горлянка* (Androsace septentrionalis Linn.). Сем. Primulaceae. Въ видѣ настоя или отвара, какъ полосканіе отъ горловой болѣзни; отъ бѣлей у женщинъ принимается внутрь.

Крыловъ Пермск. 54, Словцовъ 200, Горницкій 20.

24. — (Polygonum aviculare Linn.). Сем. Polygoneae. Отъ поноса. Идринская волость.

Анненковъ 262, Крыловъ Пермск. 57, Словцовъ 209, Горницкій 126.

25. *Грудница* (Thalictrum minus Linn.). Сем. Ranunculaceae. Отъ грыжи взрослымъ.

Анненковъ 353, Крыловъ Пермск. 32, Словцовъ 71, Горницкій 166.

26. *Гнилушки*. Гнилое, превратившееся въ муку, дерево,

высушенное, употребляется какъ дѣтская присыпка. Дер. Самодуровка.

27. Горчица (Brassica juncea Czern. et Sinapis arveusis Linn.). Сем. Cruciferae. Цѣльныя сѣмена горчицы—по нѣсколько зеренъ—принимаютъ внутрь при катаррѣ желудка. Село Абаканское.

Анненковъ 331, Горницкій 156.

28. *Гранатикъ, Грановитая дудка* (Libanotis Sibirica Linn.). Сем. Umbelliferae. Настой всего растенія пьютъ отъ боли сердца. Идринская волость.

Анненковъ 403, Крыловъ Пермск. 68.

29. *Гусельникъ* (Polygonatum officinale All.). Сем. Smilacineae.). Корневище дается дѣтямъ отъ грыжи. Дер. Стар. Кныши.

Анненковъ 106, Крыловъ Пермск. 62, Крыловъ Казанск. 33, Словцовъ 224, Горницкій 125.

30. *Девятильникъ* (Tanacetum vulgare L.). Сем. Compositae. Отъ 12 недуговъ и отъ лихорадки. Идринская волость.

Анненковъ—348, Крыловъ Пермск.—40, Крыловъ Каз.—17, Словцовъ—151, Горницкій—164.

31. *Девятильникъ* (Potentilla pensylvanica L.). Сем. Rosaceae. Отваръ пьютъ отъ лихорадки, кромѣ того, этимъ же отваромъ окачиваютъ подъ куринымъ сѣдаломъ. Абаканская волость.

32. *Деряба* (Lycopodium annotinum L.). Сем. Lycopodiaceae. Пьютъ отъ „нутра", въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ—203, Крыловъ Пермск.—41, Крыловъ Каз.—15.

33. *Дикій хмель* (Cuscuta europaea L.). Сем. Convolvulaceae. Отваръ пьютъ отъ грыжи. Идринская волость.

Анненковъ—118, Крыловъ Пермск.—79, Горницкій—61.

34. *Донникъ, Плакунъ* (Melilotus dentata Pers., M. alba Lam.). Сем. Leguminosae. Настой употребляется при внутреннихъ болѣзняхъ. Село Идринское и др.

Анненковъ 212, Крыловъ Каз.—18, Словцовъ—109, Горницкій—106.

35. *Душица* (Origanum vulgare L.). Сем. Labiatae.

Настой употребляется при боли живота. Идринская волость.

Анненковъ—234, Крыловъ Пермск.—27, Крыловъ Казанск.—20, Словцовъ—191.

36. *Душица* (Nepeta lavandulacea Lin. fil.). Labiatae. Настой отъ круженія головы и головной боли, а также отъ поноса. Идринская, Абаканская волости.

37. *Душистая мята* [Nepeta nuda L.). Labiatae. Отъ бѣлой грыжи употребляется вмѣсто чая. Мал. Хабыкъ.

Анненковъ—225, Крыловъ Пермск.—81.

38. *Егорьево копье* [Geranium pratense L.). Сем. Geraniaceae. Употребляется въ видѣ отвара при кашлѣ и другихъ болѣзняхъ. Абаканская и Идринская волости.

Анненковъ—156, Крыловъ Пермск.—38, Крыловъ Каз.—37, Словцовъ—106.

39. *Елошникъ, скрипунъ* (Equisetum hyemale L.). Сем. Equisetaceae. Отваръ отъ поноса, головной боли и другихъ болѣзней. Дер. Арбаты. Абаканская и Идринская волости.

Анненковъ—134, Крыловъ Пермск. 89, Крыловъ Каз. 64, Словцовъ—248.

40. *Жаркой цвѣтъ* (Trollius asiaticus Linn.). Сем. Ranunculaceae. Цвѣты и листья употребляются въ видѣ настоя при боляхъ въ животѣ.

О близкомъ къ Tr. asiaticus европейскомъ видѣ—Tr. europaeus L. см. Анненковъ—364, Крыловъ Пермск.—34, Словцовъ—79.

41. *Желтый перелой* (Potentilla viscosa Don.). Сем. Rosaceae. Отваръ травы даютъ дѣтямъ отъ родимца, женщинамъ для установленія живота. Новоселовская волость.

Анненковъ—271, Крыловъ Пермск.—39.

42. *Желтые пѣтушки.* (Primula officinalis L. et. Pr. elatior Jacq.). Употребляется въ видѣ отвара внутрь отъ грыжи. Абаканская волость.

Анненковъ—273, Крыловъ Пермск.—54, Горницкій 130.

43. *Живая трава* (Sedum purpureum Link.). Сем. Crassulaceae. Все растеніе употребляется въ видѣ отвара при сердцебіеніи. С. Идринское.

Анненковъ—324, Крыловъ Пермск.—89, Крыловъ Каз.—22, Словцовъ 127.

44. *Зауморъ* (Sticta pulmonaria L.). Lichenes. Отъ простуды и кашля употребляется внутрь въ видѣ отвара. Село Курагинское.

Анненковъ—343.

45. *Заячья капуста* (Sedum purpureum Link. или S. Telephium L.). Сем. Crassulaceae. Отваръ всего растенія употребляется внутрь отъ ломоты. Дер. Тагашетъ.

Литературу см. подъ № 43.

46. *Звѣробой* (Gentiana adscendens Pall). Сем. Gentianeae. Отъ ломоты. Пьютъ въ видѣ отвара и настоя. Дер. Большой Телекъ.

47. *Звонарь* (Rhinanthus Crista-galli L.). Сем. Scrophularineae. Отъ головной боли. Пьютъ въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ—295, Словцовъ—188, Горницкій—139.

48. *Зеленая полынь* (Artemisia macrobotrys Ledeb.). Сем. Compositae. Отъ боли въ животѣ, въ видѣ отвара. Идринская волость.

49. *Зеленецъ* (Lycopodium complanatum L.). Сем. Lycopodiaceae. Отваръ употребляется при боли желудка. Дер. Салба.

Анненковъ—204, Крыловъ Пермск.—47, Крыловъ Каз.—23, Словцовъ—247.

50. *Земляной ладанъ* (Valeriana officinalis L. et Valer. dubia Bunge). Сем. Valerianeae. Отваръ или настой корней употребляется внутрь при лихорадкахъ и боли желудка. Малая Минуса, Большая Иня и другія мѣста Минусинскаго края.

Анненковъ—372, Крыловъ Пермск.—130, Крыловъ Каз.—23, Словцовъ—144, Горницкій—175.

51. *Земляника* (Fragaria vesca L.). Сем. Rosaceae. Употребляются въ видѣ отвара корни земляники отъ удушья и другихъ болѣзней. Село Лугавское.

Анненковъ—147, Крыловъ Пермск.—47, Словцовъ—121, Горницкій—75.

52. *Зерница* (Phlomis tuberosa L.). Сем. Labiatae. „На этой травѣ 77 подушечекъ", должно быть цвѣточныхъ мутовокъ. Употребляется отъ порчи, въ видѣ отвара. Абаканская волость.

Анненковъ—249, Крыловъ Пермск.—95, Словцовъ—195.

53. *Змѣевикъ* (Veronica austriaca L.). Scrophularineae. Все растеніе разваривается и употребляется въ видѣ припарокъ отъ укушенія змѣи. Дер. Детлова.

54. *Змѣевка* (Polygonatum officinale All.). Сем. Smilacineae. Въ видѣ отвара употребляется все растеніе отъ золотухи и ломоты. Абаканская волость.

См. № 29.

55. *Золотарникъ*. Вѣтки съ листьями и цвѣтами нѣсколькихъ видовъ караганы (Caragana arborescens Lam., fruticosa DC, pygmaea DC). Сем. Leguminosae. Употребляются въ видѣ отвара отъ золотухи. Довольно распространенное противозолотушное средство Минусинскаго края.

Анненковъ—83.

56. *Золотарникъ* (Senecio campestris DC.). Сем. Compositae. Отваръ пьютъ отъ золотухи. Идринская волость.

57. *Измогенъ* (Rubus saxatilis L.). Сем. Rosaceae. Употребляются безплодные, лежачіе побѣги костяники,—стебли съ листьями,—въ видѣ отвара на молокѣ—дѣтямъ отъ „цвѣту" и настоя на водѣ—взрослымъ отъ сердечной боли. Село Абаканское, Идринская волость.

Анненковъ—304, Крыловъ Пермск.—59, Словцовъ—120.

58. *Исландскій мохъ, Шленскій мохъ* (Cetraria islandica Achar.). Lichenes. Употребляется отъ кашля и груд-

ной боли, въ видѣ отвара, въ смѣси по равной части съ шалфеемъ и липовымъ цвѣтомъ. Дер. Кныши, Тагашетъ, Паначева.

Анненковъ—92, Крыловъ Казанск.—71.

59. *Калина* (Viburnum opulus L.). Сем. Caprifoliaceae. Цвѣты и листья калины, въ видѣ отвара, пьютъ отъ кашля, Идринская волость, отъ золотухи—дер. Малая Минуса.

Анненковъ—378, Крыловъ Пермск.—53, Крыловъ Каз.—28, Словцовъ—140, Горницкій—148.

60. *Камелая трава* (Verbascum Thapsus. L.). Сем. Scrophularineae. Отваръ пьютъ отъ красной грыжи. Абаканская волость.

Анненковъ—374, Крыловъ Пермск.—24, Крыловъ Каз.—37, Словцовъ—182, Горницкій—177.

61. *Каменная полынь* (Artemisia frigida Willd.). Сем. Compositae. Отъ головной боли, боли въ животѣ, удушья и кашля. Идринская волость и другія мѣста. Вообще, эта трава довольно извѣстное лѣчебное средство.

Крыловъ Пермск.—80, Крутовскій—61.

62. *Каменная бѣлая трава* (Ballota lanata L.). Сем. Labiatae. Отваръ пьютъ отъ водянки. Патрашилово. Отъ головной боли пьютъ и примачиваютъ голову. Абаканская волость.

Анненковъ—60.

63. *Каменный звѣробой* (Polypodium vulgare L.). Polypodiaceae. Весьма извѣстное и распространенное средство отъ головной боли; пьютъ въ видѣ настоя и отвара.

Анненковъ—266, Крыловъ Пермск.—74.

64. *Кашкара* (Rhododendron chrysanthum L.). Сем. Ericaceae. Очень обыкновенное и общеизвѣстное средство отъ ревматизма, пьютъ въ видѣ отвара; въ видѣ присыпки для заживленія ранъ, употребляется также и при лѣченіи скота.

Анненковъ—296.

65. *Кипрей* (Epilobium angustifolium L.). Сем. Onagrariae. Въ видѣ отвара даютъ внутрь отъ бѣлой горячки. Дер. Кныши.

См. № 19.

66. *Китайскій звѣробой* (Achillea impatiens L). Сем. Compositae. Употребляется въ видѣ припарокъ при вывихахъ. Дер. Самодуровка.

67. *Клюква* (Oxycoccos palustris Pers.). Сем. Vaccineae. Все растеніе употребляется, въ видѣ отвара, отъ болѣзни желудка. Дер. Григорьевка.

Анненковъ 237, Крыловъ Пермск.—43.

68. *Козье молочко* (Tragopogon orientalis L.). Сем. Compositae. Употребляется, въ видѣ настоя, отъ рѣзачки и хомутц. Абаканская и Новоселовская волости. Отъ костяной грыжи.

Анненковъ—356, Крыловъ Казанск.—31.

69. *Костяничникъ* (Rubus saxatilis L.). Сем. Rosaceae. Отъ сердечной боли. Употребляется внутрь въ видѣ отвара. С. Большая Идра.

См. № 57.

70. *Крапива* (Urtica dioica L. et cannabina L.). Сем. Urticaceae. Корни крапивы, въ видѣ настоя, употребляются отъ нутра и поноса. Дер. Большая Иня.

Крыловъ Пермск.—60, Крыловъ Каз. 31, Словцовъ 210, Горницкій 174.

71. *Крапива жгучка* (Urtica urens L., cannabina L.). Urticaceae. При ломотахъ сѣкутъ свѣжимъ растеніемъ. Минусинскъ.

Крыловъ Пермск. 60, Крыловъ Казанск. 31, Горницкій 174.

72. *Красноголовникъ* (Trifolium pratense L.). Сем. Leguminosae. Употребляется отъ грыжи внутрь, въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ 360, Крыловъ Пермск. 55, Крыловъ Казанск. 29, Словцовъ 109.

73. *Красная полынь*. Покраснѣвшее осеннее растеніе Teloxys aristata (Moq. Tand.) изъ семейства Chenopodiaceae. Употребляется внутрь отъ красной грыжи, въ видѣ отвара. Ид-

ринская волость.

74. *Кровавикъ* (Chelidonium majus L.). Сем. Papaveraceae. Трава эта въ видѣ отвара, принятая внутрь, „полируетъ“ кровь, „разбиваетъ“ послѣ ушибовъ. Беременныя женщины пьютъ эту траву въ случаѣ, если ударятся животомъ, для того, чтобы не повредить ребенка. Идринская волость. Свѣжій молочный сокъ этого растенія, называемаго еще *чистотѣломъ*, употребляется для уничтоженія бородавокъ. Самодуровка.

Анненковъ 94, Крыловъ Пермск. 103, Крыловъ Казанск. 69, Горницкій 49.

75. *Крушина* (Rhamnus Frangula L.). Сем. Rhamnaceae. Употребляется кора, въ видѣ отвара, какъ проносное. Дер. Григорьевка.

Анненковъ 293, Крыловъ Пермск. 61, Крыловъ Казанск. 32, Словцовъ 107.

76. *Купорнь-отъ*, Чемерица (Veratrum album L.). Сем. Colchicaceae. Порошкомъ корневища татары посыпаютъ раны, въ которыхъ завелись черви (личинки мухъ).

Анненковъ 374, Крыловъ Пермск. 100, Крыловъ Каз. 66, Горницкій 166.

77. *Кукушкины сапожки* (Cypripedium macranthum Sw.). Сем. Orchideae. Все растеніе въ видѣ отвара даютъ дѣтямъ отъ родимца. Идринская волость и др.

Анненковъ 120, Крыловъ Казанск. 85.

78. *Кукушкины слезки* (Cypripedium calceolus L.). Orchideae. Отваръ листьевъ даютъ отъ родимца. Дер. Малая Минуса и др.

Крыловъ Пермск. 125, Крыловъ Казанск. 1.

79. *Листопадка* (Sticta pulmonaria L.). Lichenes. Отъ кашля и рѣзи въ животѣ. Употребляется внутрь въ видѣ отвара.

Анненковъ 344.

80. *Лукъ обыкновенный* (Allium cepa L.). Сем. Liliaceae. Поджаренный, теплый лукъ прикладывается пластинками къ пальцу

при ногтоѣдѣ. Минусинскъ.

Анненковъ 22, Горницкій 9.

81. *Лихорадочная трава* (Isopyrum fumarioides L.). Сем. Ranunculaceae. Настой травы употребляется при лихорадкахъ. Дер. Алтайская.

82. *Луговой звѣробой* (Gentiana macrophylla Pall.). Сем. Gentianeae. Отъ излому. Все растеніе употребляется въ видѣ отвара, свѣжіе листья прикладываются къ ранамъ (тѣлу). Абаканская волость. Отъ надсады пьютъ отваръ. Новоселово.

83. *Макыръ* (Polygonum Bistorta L.). Сем. Polygoneae. Отваръ корней дается внутрь отъ поноса. Село Ужурское.

Анненковъ 264, Крыловъ Пермск. 99, Крыловъ Казанск. 57, Горницкій 126.

84. *Маковыя головки* (Papaver somniferum L.). Сем. Papaveraceae. Общеизвѣстное снотворное средство. Дѣтямъ даютъ въ видѣ отвара на молокѣ. Дер. Малая Минуса.

Анненковъ 241, Горницкій 118.

85. *Малина* (Rubus idaeus L.) Сем. Rosaceae. Сушеныя ягоды, въ видѣ настоя, употребляютъ какъ потогонное.

Анненковъ 304, Крыловъ Пермск. 129, Крыловъ Каз. 36, Словцовъ 119, Горницкій 143.

86. *Марена* (Galium verum L.). Сем. Rubiaceae. Употребляется женщинами, въ видѣ отвара, внутрь при регулахъ. Новоселовская волость.

Анненковъ 152, Крыловъ Пермск. 66, Горницкій 78.

87. *Марьинъ корень* (Paeonia anomala L.). Сем. Ranunculaceae. Отъ лихорадки и поноса даютъ настой корней. Идринская волость.

Анненковъ 238, Крыловъ Пермск. 128, Крыловъ Казанск. 49.

88. *Молосникъ* (Tragopogon orientalis L.). Сем. Compositae. Отъ бѣлой грыжи. Пьютъ въ видѣ отвара. Идринская волость.

См. № 68.

89. *Морковь* (Scabiosa ochroleuca L.). Сем. Dipsaceae.

Употребляютъ, въ видѣ отвара, отъ ломоты въ спинѣ. Абаканская волость. Отъ бѣлой грыжи. С. Шушенское.

Анненковъ 318.

90. *Мухоморъ* (Delphinium elatum DC.). Сем. Ranunculaceae. Отъ „нутра" употребляется въ видѣ настойки на водкѣ. Пьютъ рюмками. Абаканская волость.

Анненковъ 124, Крыловъ Пермск. 91, Словцовъ 80.

91. *Мухоморъ, желтый борецъ* (Aconitum Anthora L.). Сем. Ranunculaceae. При сердцебіеніи пьютъ въ видѣ настоя. Дер. Тагашетъ. См. № 12.

92. *Мухоморъ* (Rhinanthus crista galli L.). Сем. Scrophularineae. Употребляется, въ видѣ отвара, при сердцебіеніи. Село Идринское.

Примѣчаніе. Вѣроятно, это растеніе принимаютъ за одинъ изъ видовъ Aconitum или Delphinium, общеизвѣстныхъ въ Минусинскомъ краѣ подъ именемъ мухоморовъ.

93. *Мята душная* (Nepeta macrantha L.). Сем. Labiatae. Настой употребляется вмѣсто обыкновенной мяты.

94. *Мята* (Mentha crispata Schr.). Употребляется отъ боли живота и другихъ болѣзней. Разводится въ огородахъ— Таскино и др.

Анненковъ 207.

95. *Мята аглицкая или перцовая* (Mentha piperita). Сем. Labiatae. Разводится въ огородахъ. Пьютъ отъ кашля и другихъ болѣзней. У старовѣровъ дер. Таскиной служитъ суррогатомъ чая.

Анненковъ 214, Крыловъ Пермск. 70, Крыловъ Казанск. 42, Горницкій 107.

96. *Надсадная трава* (Rhinanthus crista galli L.). Сем. Scrophularineae. Пьютъ отъ надсады. Идринская волость.

См. № 47.

97. *Надсадная трава* (Gentiana macrophyHa Pall.). Сем. Gentianeae. Отъ надсады. Пьютъ въ видѣ отвара. Идринская волость.

См. № 82.

98. *Надсадная трава* (Anemone sylvestris L.). Сем. Ranunculaceae. Отъ надсады. Пьютъ въ видѣ настоя или отвара. Шушенская волость.

Анненковъ 35, Крыловъ Пермск. 82, Словцовъ 75.

99. *Горишная трава* (Gentiana Amarella L.). Сем. Gentianeae. Употребляется въ видѣ отвара отъ лихорадки; въ ветеринарной практикѣ при лѣченіи лошадей отъ запала. Абаканская волость.

Анненковъ 154, Крыловъ Пермск. 53, Словцовъ 178.

100. *Одномѣсячная трава* (Pedicularis comosa L.). Сем. Scrophularineae. Отваръ употребляется внутрь при боли въ животѣ и др. Дер. Тагашетъ.

Анненковъ 243, Словцовъ 187, Горницкій 119.

101. *Одномѣсячная трава* (Oxytropis pilosa DC.). Сем. Leguminosae. Употребляется внутрь при женскихъ болѣзняхъ. Дер. Каменка.

Анненковъ 238, Крыловъ Пермск. 72.

102. *Односторонка* (Saussurea discolor DC.). Сем. Compositae. Отваръ листьевъ употребляется отъ головной боли. Дер. Кныши; отъ золотухи - дер. Салба.

103. *Папоротникъ* (Asplenium filix femina, Bernh.). Filices. Отъ испуга. Отваромъ поятъ и купаютъ дѣтей. Идринская волость.

Анненковъ 55, Крыловъ Пермск. 101, Словцовъ 249.

104. *Папоротникъ* (Struthiopteris germanica Willd.). Filices. Толченое корневище дается лошадямъ отъ кашля. Дер. Средняя Шушь.

Анненковъ 344, Крыловъ Пермск. 86, Крыловъ Казанск. 46, Словцовъ 250.

105. *Перелойка* (Anemone sylvestris L.). Ranunculaceae. Въ видѣ отвара или настоя употребляется отъ рѣзачки. Село

Шушенское, Самодуровка и другія мѣста.

См. № 98.

106. *Перелойная трава* (Scabiosa ochroleuca L.). Сем. Dipsaceae. Въ видѣ отвара внутрь отъ бѣлей у женщинъ. Идринская волость.

См. № 89.

107. *Перелойка* (Lathyrus tuberosus L.). Сем. Leguminosae. Отъ боли въ животѣ употребляется въ видѣ отвара. Дер. Большой Телекъ.

Анненковъ 187.

108. *Пихта* (Pinus pichta Fisch.). Coniferae. Свѣжія вѣтви пихты употребляются для приготовленія ваннъ при ломотахъ. Минусинскъ и др. мѣста.

109. *Плакунъ* (Androsace filiformis Retz.). Сем. Primulaceae. Отъ ранъ. Отваръ пьютъ и имъ же примачиваютъ раны. Абаканская волость.

110. *Плакунъ алый* (Lythrum virgatum L. et L. salicaria L.). Сем. Lythrarieae. Употребляется отъ цвѣту у новорожденныхъ. Новоселовская волость.

Анненковъ 206.

111. *Плакунъ желтый* (Lysimachia vulgaris L.). Сем. Primulaceae. Въ видѣ настоя употребляется при грыжахъ. Идринская волость.

Анненковъ 205, Крыловъ Пермск. 77, Словцовъ 200.

112. *Погонная трава* (Euphorbia lutescens C. A. Mey). Сем. Euphorbiaceae. Отъ запора, какъ слабительное. Употребляется въ видѣ отвара и настоя. Идринская волость.

Анненковъ 140.

113. *Подборная трава* (Capsella bursa pastoris Mönch.). Сем. Cruciferae. Настой пьютъ послѣ родовъ, когда является боль въ животѣ.

Анненковъ 82, Крыловъ Казанск. 46, Словцовъ 88, Горницкій 45.

114. *Подорожникъ* (Plantago major L.). Сем. Plantagineae. Свѣжіе листья прикладываютъ къ ранамъ; настой травы пьютъ при чахоткѣ и др. Идринская волость и др.

Анненковъ 259, Крыловъ Пермск. 56, Крыловъ Казанск. 51, Словцовъ 202, Горницкій 125.

115. *Полевая трава* (Sedum purpureum Link.). Сем. Crassulaceae. Отъ излома пьютъ въ видѣ настоя. Абаканская волость.

См. №№ 43 и 45.

116. *Ползунъ* (Lycopodium annotinum L.). Сем. Lycopodiaceae. Отваръ пьютъ при регулахъ. Дер. Салба.

Анненковъ 203, Крыловъ Пермск. 41, Крыловъ Казанск. 15.

117. *Полынь* (Artemisia Sieversiana Willd.). Сем. Compositae. Отваромъ поятъ маленькихъ дѣтей отъ грыжи, по три раза въ день. Абаканская волость. Пьютъ отъ лихорадки. Новоселово.

Примѣчаніе. Должно быть, этотъ видъ Artemisiae принимается за обыкновенную полынь Artemis absinthium L, на которую она дѣйствительно похожа.

118. *Полынь* (Artemisia sacrorum Ledeb. et Art. sericea W.). Compositae. Пьютъ отъ лихорадки. Новоселовская волость.

Примѣчаніе. Оба эти вида, по ошибкѣ, принимаются за обыкновенную полынь.

119. *Полынь горькая* (Artemisia absinthium L.). Compositae. Общеупотребительное лѣкарство отъ лихорадки, употребляется въ видѣ отвара и настоя на водѣ и водкѣ. Часто собирается на мѣстѣ (дер. Шушенская, Салба), но большая часть пріобрѣтается изъ аптекъ и лавокъ.

Анненковъ 47, Крыловъ Пермск. 80, Крыловъ Казанск. 51, Горницкій 25.

120. *Пороховница, дождевики.* Разные виды рода Bovista и Lycoperdon изъ сем. Gasteromycetes. Употребляются съ дозрѣвшими спорами (порохомъ, мукой) для присыпокъ; крѣпкій отваръ для растиранія при ревматизмахъ. Минусинскъ.

БИБЛИОТЕКА
Гос. Музея имени П. Шенкова
в г. Минусинске
~~18389~~ 21866

Крыловъ Пермск. 43.

121. *Порѣзная трава* (Achillea millefolium L. setacea Led.). Compositae. Отъ рѣзи, золотника и лихорадки употребляется въ видѣ настоя. Самодуровка, Абаканская волость и др. мѣста.

Анненковъ 4, Крыловъ Пермск. 80, Крыловъ Казанск. 63, Словцовъ 152, Горницкій 2.

122. *Придорожная трава* (Potentilla bifurca L.). Сем. Rosaceae. Отъ сильныхъ красокъ пьютъ въ видѣ отвара. Малая Минуса.

123. *Приточная трава* (Veronica Anagallis L. et Ver. Beccabunga L.). Сем. Scrophularineae. Употребляется какъ припарка для ранъ въ свѣжемъ видѣ и сушеная (толченая). Дер. Малая Минуса.

Анненковъ 376, Крыловъ Пермск. 93, Словцовъ 185, Горницкій 178.

124. *Пупная трава* (Parnassia palustris L.). Сем. Droseraceae. Отъ пупной грыжи. Идринская волость.

Анненковъ 242, Крыловъ Пермск. 75, Крыловъ Казанск. 47, Словцовъ 90, Горницкій 119.

125. *Пухлянка* (Veronica incana L.). Сем. Scrophularineae. Пьютъ отъ простуды. Идринская волость.

Анненковъ 377.

126. *Пурганецъ* (Корни разныхъ видовъ молочайника: Euphorbia lutescens C. A. Mey., Euph. Cyparissias L., alpina C. A. Mey и др.). Сем. Euphorbiaceae. Истолченные корни употребляются какъ рвотное и сильное слабительное. Верхняя часть корня вызываетъ рвоту, нижняя — поносъ. Употребляется при лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ по всему Минусинскому округу.

127. *Ракитникъ, верба и тальникъ.* Разные виды рода Salix. Употребляютъ кору этихъ растеній отъ лихорадки, въ видѣ отвара. Дер. Большая Иня и другія мѣста.

Анненковъ 316.

128. *Ревень* (Rheum Rhaponticum L.). Сем. Polygoneae.

Употребляется въ видѣ настоя, отвара и порошка отъ поноса, боли живота. Идринская, Абаканская волости и другія мѣста.

Анненковъ 294.

129. *Ромашка* (Matricaria Chamomilla L.). Сем. Compositae. Цвѣты ромашки употребляются повсемѣстно отъ кашля, боли живота, горла и др.

Анненковъ 209, Крыловъ Казанск. 55, Горницкій 105.

130. *Родимичная трава* (Aquilegia sibirica Lam.). Сем. Ranunculaceae. Отъ припадковъ родимца поятъ въ видѣ отвара. Село Шушенское.

131. *Репейникъ* (Lappa tomentosa Lam., L. major Gärtn.). Сем. Compositae. Отъ золотухи пьютъ отваръ корней и листьевъ; отъ выпаденія волосъ отваромъ моютъ голову. Дер. Самодуровка.

Анненковъ 185, Крыловъ Пермск. 85, Словцовъ 159, Горницкій 93.

132. *Самокопка, Кузьмичева трава* (Ephedra vulgaris L. submonostachya Led.). Сем. Gnetaceae. Крѣпкій отваръ всего растенія пьютъ отъ ломоты, корни, въ видѣ отвара, отъ „дурной болѣзни“, ими замѣняютъ дорогую траву (rad. Sarsaparillae), отъ чего произошло и названіе растенія „самокопка“, отъ слова „сами копаютъ“, т. е. добываютъ на мѣстѣ. Подъ именемъ Кузмичевой травы она сдѣлалась извѣстна только въ послѣднее время, благодаря печатнымъ рекламамъ.

Анненковъ 132. Новѣйшая литература не приводится.

133. *Сахчанъ-отъ*, Крапива (Urtica cannabina L.). Сем. Urticaceae. Употребляется Качинцами съ Абакана при ревматизмахъ для растиранія распаренными стеблями.

См. №№ 70 и 71.

134. *Свинороинкъ* [Potentilla anserina L.). Сем. Rosaceae. Все растеніе употребляется въ видѣ отвара или настоя отъ красной женской грыжи. Идринская волость.

Анненковъ 269, Крыловъ Пермск. 60, Словцовъ 122, Горницкій 129.

135. *Свинороїка* (Polygonum aviculare L.). Сем. Polygoneae. Отъ поноса употребляется внутрь въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ 263, Крыловъ Пермск. 57, Словцовъ 209, Горницкій 126.

136. *Сердечная трава* (Solidago Virga aurea L.). Сем. Compositae. Отъ сердечной боли пьютъ въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ 335, Словцовъ 146, Горницкій 159.

137. *Сердечная трава* (Dianthus sinensis Fisch., D. Seguieri, Villars.). Сем. Silenaceae. Пьютъ въ видѣ отвара или настоя во время менструацій. Абаканская волость.

Анненковъ 125, Словцовъ 92.

138. *Серпуха* (Serratula coronata L.). Сем. Compositae. Употребляется въ видѣ присыпки для заживленія ранъ у скота. Абаканская волость.

Анненковъ 327, Крыловъ Пермск. 47, Словцовъ 160.

139. *Синій плакунъ, приточная трава* (Campanula glomerata L.). Сем. Campanulaceae. Употребляется въ видѣ отвара отъ костяной грыжи. Идринская волость.

Анненковъ 80, Словцовъ 168, Горницкій 42.

140. *Синій плакунъ* (Veronica longifolia L.). Сем. Scrophularineae. Употребляется для припарокъ съ молокомъ. Абаканская волость.

Анненковъ 377, Словцовъ 184.

141. *Скрипунъ* (Equisetum hyemale L.). Сем. Equisetaceae. Употребляется въ видѣ отвара отъ грыжи и какъ мочегонное. Дер. Салба.

См. № 39.

142. *Скрипунъ* (Sedum purpureum Link.). Сем. Crassulaceae. Отъ скрипа въ суставахъ. Дер. Салба, Идринская вол.

См. №№ 43, 45, 115.

143. *Смородина черная* (Ribes nigrum L.). Сем. Ribesiaceae. Вмѣсто чая пьютъ отъ золотухи. Общеупотребительное средство.

Анненковъ 298, Крыловъ Пермск. 90, Крыловъ Казанск. 59, Словцовъ 169, Горницкій 140.

144. *Собачьи ягоды* (Solanum Dulcamara L. var. persica Trautv.). Сем. Solanaceae. Отъ грыжи—пьютъ въ видѣ отвара; отъ лсмоты дѣлаютъ паровыя ванны. Новоселово и др.

Анненковъ 333, Крыловъ Пермск. 26, Крыловъ Каз. 56, Словцовъ 181.

145. *Солодка* (Glycyrrhiza glandulifera W. K.). Сем. Leguminosae. Корни — весьма извѣстное средство отъ кашля, ихъ пьютъ въ видѣ настоя и употребляютъ сухіе для жеванія.

Анненковъ 159, Горницкій 81.

146. *Солонечная трава* (Statice Gmelini Willd.). Сем. Plumbagineae. Отъ грыжи у мужчинъ. Пьютъ въ видѣ отвара. Абаканская волость.

Анненковъ 342, Словцовъ 201.

147. *Солонечная трава, Бюрю-отъ* у Качинцевъ (Goniolimon speciosum Boiss.). Plumbagineae. Отъ бѣлей у женщинъ употребляется въ видѣ отвара. Абаканская и Идринская волости. Качинцы пьютъ.

148. *Сонъ* (Campanula cervicaria L.). Сем. Campanulaceae Пьютъ, въ видѣ настоя, отъ безсонницы. Идринская волость.

Анненковъ 79, Крыловъ Пермск. 46.

149. *Сорокоприточная трава* (Achillea millefolium L.). Сем. Compositae. Отъ рѣзачки пьютъ въ видѣ отвара. Малая Минуса.

См. № 121.

150. *Сосновая трава* (Hypericum attenuatum Chois. et Hyp. elegans Steph.). Сем. Hypericineae. Пьютъ, въ видѣ отвара, отъ боли живота и др. Шалаболина, Имиссъ.

Крыловъ Пермск. 97.

151. *Сосновый цвѣтъ, сосновыя почки* (Gemma pini отъ Pinus sylvestris L.). Для мужчинъ отъ рѣзачки, пьютъ въ

видѣ отвара. Самодуровка и др.

Крыловъ Каз. 60, Горницкій 125.

152. *Спорынья* (Claviceps purpurea Tul). Pyrenomycetes. Сельскія повитухи употребляютъ для ускоренія родовъ.

Крыловъ Пермск. 91, Крыловъ Каз. 60, Горницкій 154.

153. *Стародубка* (Scorzonera austriaca W.). Сем. Compositae. Отъ боли живота употребляютъ внутрь въ видѣ отвара. Абаканская волость.

154. *Суконная трава* (Pulmonaria mollis Wolff.). Сем. Borragineae. Употребляется латышами изъ дер. Буланки и Суэтукъ въ видѣ отвара при внутреннихъ болѣзняхъ.

155. *Троелистка* (Menyanthes trifoliata L.). Сем. Gentianeae. Отъ золотника, лихорадки, для аппетита и въ другихъ болѣзняхъ пьютъ въ видѣ настоя на водѣ и водкѣ. Общеупотребительное средство.

Анненковъ 215, Крыловъ Пермск. 95, Крыловъ Казанск. 62, Словцовъ 178, Горницкій 108.

156. *Таежный борецъ* (Aconitum Lycoctonum L.). Сем. Ranunculaceae. Отъ „нутра". Настаиваютъ на водкѣ и пьютъ рюмками. Абаканская волость.

См. № 10.

157. *Таежный перецъ* (Daphne Mezereum L.). Сем. Thymeleae. Сѣмена употребляются какъ сильное слабительное при лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ. Дер. Верхній Кужебаръ.

См. № 21.

158. *Татарская сарана, каменная трава* (Umbilicus spinosus DC.). Сем. Crassulaceae. Отваръ всего растенія употребляется отъ лихорадки. Абаканская волость.

159. *Трава отъ золотника* (Gypsophila altissima L). Сем. Silenaceae. Въ видѣ отвара пьютъ три раза въ день отъ золотника (маточная болѣзнь). Абаканская волость.

Анненковъ 161

160. *Трава картошки* (Potentilla viscosa Don.). Сем.

Rosaceae. Отъ подъему пьютъ отваръ, для заживленія ранъ толченую смѣшиваютъ съ водой и мукой и полученное тѣсто прикладываютъ къ ранѣ.

См. № 41.

161. *Трава щавель* (Rumex acetosa L.). Сем. Polygoneae. Отъ боли поясницы варятъ и пьютъ. Абаканская волость.

162. *Туданъ-отъ*. Конехвостникъ (Hippuris vulgaris L.). Сем. Halorageae. Употребляется Минусинскими татарами отъ лихорадки въ видѣ отвара, и для окуриванія.

163. *Тызы-отъ* (Aconitum Lycoctonum L.). Сем. Ranunculaceae. Корни употребляются отъ зубной боли сагайцами съ р. Аскыза. Кладутъ по кусочку на больной зубъ.

См. №№ 10, 156.

164. *Урочная трава* (Anemone sylvestris L.). Сем. Ranunculaceae. Отъ урока даютъ въ видѣ настоя или отвара. Идринская волость.

См. №№ 98, 105.

165. *Утесная трава* (Sedum hybridum L.). Сем. Crassulaceae. Отъ порчи и костяной грыжи. Абаканская волость.

166. *Филичья трава* (Aconitum Napellus L., Ac. volubile Pall.). Употребляется въ видѣ отвара или настоя на водѣ и водкѣ при простудахъ. Сильно дѣйствующее средство. Шушенская волость и др.

См. № 11.

167. *Хребтовый звѣробой* (Polypodium Dryopteris L.). Polypodiaceae. Отъ посѣку. Толкутъ и прикладываютъ къ ранѣ. Абаканская волость.

Анненковъ 266, Крыловъ Пермск. 51, Крыловъ Каз. 25.

168. *Христовъ поясъ* (Lycopodium annotinum L.). Сем. Lycopodiaceae. Отъ боли въ поясницѣ. Употребляется внутрь въ видѣ отвара.

См. №№ 32, 116.

169. *Царскій костыль* (Verbascum Thapsus L.). Сем.

Scrophularineae. Употребляется въ видѣ настоя и отвара отъ кашля и другихъ болѣзней, въ видѣ порошка для вдуванія въ ухо отъ глухоты. Идринская волость, Идренское.

См. № 60.

170. *Цѣпкая трава* (Galium Aparine L.). Сем. Rubiaceae. Отъ боли въ спинѣ пьютъ въ видѣ отвара. Идринская волость.

Анненковъ 151, Крыловъ Пермск. 78.

171. *Чага* (Трутовики—Polyporus fomentarius Fr., igniarius и др.). Polyporei. Служатъ суррогатомъ чая, особенно, у охотниковъ, промышляющихъ въ лѣсу. Дер. Означенное и др.

172. *Черемица, Чемерица* (Veratrum album L., Ver. nigrum L.). Въ видѣ настоя или отвара однихъ листьевъ дается дѣтямъ при грыжахъ. Дер. Салба и др.

См. № 76.

173. *Череда* (Inula britannica L.). Сем. Compositae. Отъ золотухи пьютъ въ видѣ настоя или отвара. Село Идринское.

Анненковъ 176, Крыловъ Пермск. 52, Словцовъ 147.

Примѣчаніе. Не по ошибкѣ ли это растеніе названо чередой? Вѣроятно, его принимаютъ за Bidens cernua въ молодомъ возрастѣ?

174. *Череда* (Bidens tripartita L., Bid. cernua L.). Сем. Compositae. Самое обыкновенное и общеизвѣстное средство отъ золотухи; отваръ пьютъ и имъ же обмываютъ раны.

Анненковъ 65, Крыловъ Пермск. 99, Крыловъ Казанск. 66, Словцовъ 147, Горницкій 34.

175. *Черемша* (Allium victoriale L.). Сем. Liliaceae. Общеизвѣстное средство отъ цынги, ѣдятъ свѣжую и засоленную.

Анненковъ 34.

176. *Черемуха* (Prunus Padus L.). Сем. Amygdaleae. Цвѣты, листья и вѣтки употребляются въ видѣ отвара внутрь и для купанія. Идринская волость.

Анненковъ 276, Крыловъ Казанск. 67, Словцовъ 117, Горницкій 131.

177. *Черника* (Vaccinium Myrtillus L.). Сем. Vaccinieae. Сушеныя ягоды черники, въ видѣ отвара, даютъ дѣтямъ и взрослымъ при простомъ и кровавомъ поносѣ. Общеизвѣстное средство.

Анненковъ 370, Словцовъ 171, Горницкій 175.

178. *Черная трава* (Cypripedium guttatum Sw.). Сем. Orchideae. Отваромъ этой травы поятъ дѣтей отъ грыжи. Идринская волость.

Крыловъ Пермск 53, Крыловъ Казанск. 5.

179. *Черноголовникъ* (Sanguisorba officinalis L.). Сем. Rosaceae. Отваръ корней употребляется внутрь при кровавыхъ поносахъ. Дер. Малая Минуса.

Анненковъ 314, Крыловъ Пермск. 60, Крыловъ Казанск. 12, Словцовъ 125, Горницкій 150.

180. *Черногорка, Черногривка* (Adonis apennina L., Ad. vernalis L.). Сем. Ranunculaceae. Пьютъ отъ запоя, въ видѣ настоя и отвара. Село Шалоболинское и др.

Крыловъ Пермск. 92.

181. *Чертово ребро* (Cimicifuga foetida L.). Сем. Ranunculaceae. Настой всего растенія пьютъ отъ лихорадки. Идринская волость.

182. *Чертополохъ* (Cirsium Gmelini L.). Сем. Compositae. Отваръ листьевъ даютъ дѣтямъ внутрь отъ родимца. Дер. Малая Минуса.

Анненковъ 99.

183. *Шипишникъ, Шиповникъ* (Rosa cinnamomea L., R. Gmelini Rgl.). Сем. Rosaceae. Корни въ видѣ отвара даютъ внутрь дѣтямъ при кровавыхъ поносахъ. Довольно извѣстное въ Минусинск. округѣ средство.

Анненковъ 300, Крыловъ Пермск. 103.

184. Calimeris altaica Nees. Сем. Compositae. Отъ рѣзачки. Идринская волость. Отъ живота, во время беременности пьютъ для очистки ребенка. Село Идринское.

185. Bupleurum exaltatum DC. Сем. Umbelliferae. Пьютъ

въ видѣ отвара отъ боли въ спинѣ. Идринская волость.

186. *Лиственичная замша* (Polyporus officinalis Fr.). Polyporei. Мицелій этого гриба, растущій въ слояхъ лиственницы, въ видѣ кожи, вываривается и высушивается, полученное вещество, похожее на замшу, употребляется для заживленія ранъ. Прикладывается къ ранѣ, вмѣсто корпіи.

См. *Кривошапкинъ*. „Енисейскій округъ и его жизнь". О лиственичной бумагѣ.

II. Лѣчебныя средства животнаго происхожденія.

1. *Бодяга, бадяга, надошникъ* (Spongilla s. Ephydata fluviatilis и другіе виды spongillae, классъ Coelenterata, растущихъ въ прудахъ, рѣкахъ и озерахъ Минусинскаго округа, почти повсемѣстно употребляется въ истертомъ видѣ въ смѣси съ водкой отъ синевикъ подъ глазомъ и въ смѣси съ деревяннымъ масломъ или коровьимъ масломъ для втиранія при ломотахъ.

2. *Бычье сало и баранье сало*. Подъ общимъ названіемъ *свѣчное* сало—чистое, топленое и въ смѣси съ дегтемъ и скипидаромъ употребляется снаружи для смазыванія и втиранія при простудахъ, ломотахъ и другихъ болѣзняхъ.

3. *Медвѣжій жиръ* (Adeps ursi). Употребляется снаружи, вмѣсто свиного сала, иногда при лѣченіи лошадей и скота.

4. *Гусиный жиръ*—полужидкій, общеизвѣстное и весьма распространенное средство для смазыванія отмороженныхъ частей тѣла.

5. *Медвѣжья желчь* (Fel ursi), высушенная съ мѣшечкомъ, употребляется внутрь.

Примѣчаніе. Должно быть, средство это заимствовано отъ инородцевъ. Сойоты также употребляютъ это средство.

6. *Змѣиные выползки*. Шкурки змѣй, Trigonocephalus Halys Pall.(?), можетъ быть и Trigonoceph. intermedius Strauch (?), находимыя въ утесахъ послѣ линянія, иногда употребляются внутрь отъ лихорадки, въ видѣ размельченнаго порошка.

7. *Майки, майскіе жуки* (Meloë majalis L., M. violaceus и другіе виды). Употребляются внутрь отъ укушенія бѣшеными собаками. Средство это несомнѣнно занесено изъ Европейской Россіи, гдѣ оно довольно извѣстно при лѣченіи водобоязни.

8. *Мушки, шпанскія мушки* (Lytta vesicatoria Fabr.). Coleopterae. Встрѣчаются по всему Минусинскому округу на разныхъ лиственныхъ деревьяхъ—ивахъ, тополѣ и др., а также на нѣкоторыхъ травахъ. Самыми сильными, т. е. болѣе дѣйствительными, считаются собранныя на троелисткѣ (Menyanthes trifoliata L.). Употребленіе толченыхъ мушекъ снаружи въ смѣси съ мукой, въ видѣ теста, довольно распространенное средство отъ головной боли, внутрь даютъ людямъ и животнымъ при укушеніи бѣшеными собаками, какъ предохранительное средство отъ водобоязни. Дер. Малая Ничка и др.

9. *Мурашиное масло*. Буроватая, мутная водяная жидкость съ специфическимъ запахомъ, приготовленная изъ комковъ „масла", находимаго въ гнѣздахъ муравьевъ, живущихъ въ глухихъ лѣсахъ. Употребляется снаружи для втиранія при ломотахъ и другихъ болѣзняхъ. Дер. Арбаты, село Абаканское и другія мѣста.

Примѣчаніе. Составъ и матеріалъ для состава мурашинаго масла Музею не извѣстенъ. Изъ распросовъ, при какихъ условіяхъ находятъ „масло", изъ его наружнаго очертанія, цвѣта и консистенціи надо полагать, что оно вовсе не животнаго происхожденія, а растительнаго, съ небольшою примѣсью лѣсного мусора, яичекъ и самыхъ муравьевъ. Яицевидное, студенистое бѣлое вещество, принимаемое за муравьиное масло, скорѣе всего будетъ грибъ изъ Сем. Phalloideae, быть можетъ, мололой Phallus impudicus, Tr. или Clathrus. Первый изъ нихъ, подъ именемъ „землянаго масла", употребляется при ломотахъ въ Казанской губ., о второмъ см. Weinmann, „Gastero-et Hymenomycetes hucusque in Imperio Rossico observatos". Petropolis. 1836 p. 543

10. *Тараканы, прусаки* (Blattae germanicae). Orthopterae. Употребляются внутрь при водянкахъ въ видѣ порошка и настоя. Средство это несомнѣнно занесено изъ Восточной Россіи и и замѣняетъ собою черныхъ таракановъ (Periplaneta orientalis), не встрѣчающихся въ Минусинскомъ округѣ.

III. Лѣчебныя средства минеральнаго происхожденія.

1 и 2. *Алебастръ* (гипсъ, сѣрнокислая известь) очень обыкновенный минералъ Минусинскаго края. Употребляется для лѣчебныхъ цѣлей—сырой и обожженный. Сырой наскабливается и употребляется въ видѣ присыпки для ранъ, обожженный-толченый и просѣянный употребляется при лѣченіи лошадей тоже для засыпки ранъ отъ „подсѣда“ и другихъ наружныхъ поврежденій.

3—5. *Бузунъ* (горькія соли, тенардитъ, глауберовая соль и др.) употребляется людьми чаще всего при лѣченіи домашняго скота для аппетита и какъ слабительное. Химическій составъ бузуна неодинаковъ, во всѣхъ образцахъ, находящихся въ Музеѣ, преобладаетъ водный сѣрнокислый натръ. Нѣкоторые образцы бузуна были химически изслѣдованы. См. *Шмидтъ* „Mélanges physiques et chimiques tirés du Bull. de l'Acad. Impér. de Sciences de St. Pétersbourg. T. XII и д-ръ *Билль* въ „Фармацевтическомъ Журналѣ“ за 1880 г. стр. 105.

6. *Каменное масло* (черное), по Сойотски Хаяюрю и Каячю, черное, вязкое, въ видѣ экстракта, вещество, добываемое сойотами на утесахъ Саянскихъ горъ, какъ лѣчебное средство, отъ которыхъ оно пріобрѣтается русскими промышленниками и сосѣдними крестьянами. Употребляется внутрь въ водномъ растворѣ.

Примѣчаніе: Образцы изъ Минусинскаго округа не были подвергнуты химическому анализу, но схожіе съ ними образцы также изъ Саянскихъ горъ, извѣстные подъ названіемъ „бурятскаго каменнаго масла“, были изслѣдованы О. Іогансономъ и оказались экскрементами мелкаго млекопитающаго, живущаго въ горахъ, экскрементами, перемѣшанными съ частицами вывѣтрившейся горной породы „кристаллическаго сланца“. См. „Фармацевтическій Журналъ“ 1887 г. стр. 49.

7, 8, 9. *Каменное масло бѣлое и желтоватое.* Кристаллическая, чаще всего аморфная, въ видѣ натека, масса, перемѣшанная съ пескомъ и кусочками горной породы, на которой она собрана. Общеизвѣстное народное лѣчебное средство отъ поноса, боли живота, иногда и для глазныхъ примочекъ. Внутрь принимается въ видѣ раствора.

Примѣчаніе. Въ Музеѣ имѣются слѣдующіе образцы „каменнаго масла“: 1) желтоватая полукристаллическая масса съ большимъ содержаніемъ желѣзнаго купороса и кускомъ почти разрушеннаго сѣрнаго колчедана (марказита), съ Енисея близь дер. Езагашъ, гдѣ она добывается изъ береговыхъ утесовъ; 2) бѣлая скрытно-кристаллическая масса съ кусочками сѣраго глинистаго сланца. Это вещество г. Гревингкъ (см. ниже) называетъ квасцами; 3) бѣловатая аморфная масса, собранная на известковыхъ песчаникахъ на правомъ берегу Енисея, выше впаденія Абакана, повидимому, содержитъ землистое, нерастворимое вещество, быть можетъ, гипсъ или глиноземъ. О химическомъ составѣ „каменнаго масла“ см. проф. Шмидтъ: „Горное масло съ р. Чулыма“, „Фармацевтическій журналъ“ 1885 г., № 40.

10, 11, 12. *Мѣлъ.* Мѣстные жители Минусинскаго края принимаютъ за „мѣлъ“ довольно разнородныя горныя породы, по виду бѣлыя и землистыя, чаще всего—вывѣтрившійся известнякъ, землистый бѣлый мергель и землистый гипсъ. Мѣлъ употребляется внутрь отъ изжоги и снаружи для присыпокъ при рожахъ. Средство это общеизвѣстное.

13. *Кровавикъ* (Аморфная красная желѣзная руда). Употребляется внутрь, для чего кусочки кровавика скоблятъ, смѣшивая съ водкой, и пьютъ рюмками. Средство довольно извѣстное и распространенное отъ боли живота и другихъ болѣзней.

14. *Соль* (Хлористый натръ). Отъ зубной боли кладутъ по крупинкѣ соли на больной зубъ, въ дупло. Минусинскъ. Отъ гор-

ловой боли употребляется для полосканія.

IV. Разные предметы, употребляемые въ народной медицинѣ Минусинскаго края.

1. *Яичный деготь* [1]). Приготовляется ex tempore, во время надобности, сухой перегонкой вареннаго куринаго яйца въ скорлупѣ на свѣчкѣ, употребляется для смазыванія лишаевъ.

2. *Костяной деготь*. Получается сухой перегонкой свѣжихъ скотскихъ костей. Добывается въ небольшомъ количествѣ для лѣчебныхъ цѣлей — для смазыванія накожныхъ сыпей и друг. Образецъ изъ д. Патрошиловой.

3, 4, 5. *Дегти осиновый, пихтовый и березовый*. Первые два приготовляются въ очень незначительномъ количествѣ исключительно для лѣчебныхъ цѣлей и продаются значительно дороже березоваго. Употребленіе дегтя въ народной медицинѣ общеизвѣстное.

6, 7. *Тополевый и тальниковый деготь*. Совсѣмъ не деготь, а пригорѣлая уксусная кислота (acetum pyrolignosum), приготовляется въ небольшомъ количествѣ сухой перегонкой вѣтокъ, спеціально, какъ лѣкарства, для наружнаго употребленія. Образцы куплены на Минусинскомъ базарѣ отъ крестьянина изъ д. Патрошиловой.

1) Этого предмета нѣтъ въ коллекціи Музея. Способъ приготовленія его записанъ со словъ крестьянина Сѣмечкина изъ дер. Тагашетъ.

V. Гербарій, заключающій полные экземпляры растеній, употребляемыхъ въ народной медицинѣ Минусинскаго края и находящихся въ коллекціи лѣчебныхъ травъ въ Музеѣ.

Нумера, цитируемые при каждомъ растеніи, соотвѣтствуютъ нумеру коллекціи лѣчебныхъ травъ.

1. Achillea impatiens L. 66.
2. „ millefolium L. 121, 149.
3. „ ptarmica L. 14.
4. Aconitum Anthora L. 12, 91.
5. „ barbatum Patr. 12, 91.
6. „ Lycoctonum L. 10, 156, 163.
7. „ Napellus L. 11, 106.
8. „ volubile Pall. 6, 11, 16.
9. Adonis apennina L. 180.
10. „ vernalis L. 180.
11. Allium cepa L. 83.
12. „ victoriale L. 175.
13. Anemone sylvestris L. 98, 164, 105.
14. Androsace filiformis Retz. 109.
15. „ septentrionalis L. 23.
16. Antennaria dioica Gärtn. 18.
17. Aquilegia sibirica Lam. 130.
18. Artemisia Absynthium L. 119.
19. „ macrobotrys Ledeb. 48.
20. „ sacrorum Ledeb. 118.
21. „ Sieversiana Willd. 117.
22. Asplenium filix femina Bernh. 103.
23. Astragalus melilotoides Pall. 20.
24. Ballota lanata L. 62.
25. Betula alba L. 7.
26. Bidens cernua L. 174.
27. „ tripartita L. 174.
28. Bovistae variae 120.
29. Brassica juncea Czern. 27.
30. Bupleurum exaltatum DC. 185.
31. Calimeris altaica Nees. 181.
32. Campanula cervicaria L. 148.
33. Capsella bursa pastoris Mönch. 113.
34. Caragana arborescens Lam. 55.
35. „ frutescens DC. 55.
36. „ pygmaea DC. 55.
37. Cetraria islandica Achar. 58.
38. Chelidonium majus L. 76.
39. Cimicifuga foetida L. 181.
40. Cirsium Gmelini L. 182.

41. Claviceps purpurea Tul. 152.
42. Cuscuta europaea L. 33.
43. Cucumis citrillus Seringe. 2.
44. Cypripedium guttatum Sw. 178.
45. „ Calceolus L. 81.
46. „ macranthum Sw. 80.
47. Daphne Mezereum L. 21, 157.
48. Delphinium elatum DC. 90.
49. Dianthus Seguierii Vill. 137.
50. „ sinensis Fisch. 137.
51. „ superbus L. 1.
52. Ephedra vulgaris L. submonostachya Led. 132.
53. Epilobium angustifolium L. 19, 65.
54. Equisetum hyemale L. 39, 141.
55. Euphorbia alpina C. A. Mey. 126.
56. „ Cyparissias L. 126.
57. „ lutescens C. A. Mey. 112, 123.
58. Fragaria vesca L. 51.
59. Galium Aparine L. 170.
60. „ verum L. 86.
61. Gentiana Amarella L. 99.
62. „ adscendens Pall. 46.
63. Gentiana macrophylla Pall. 97, 82.
64. Geranium pratense L. 38.
65. Glycyrrhiza glandulifera W. K. 145.
66. Gypsophila altissima L. 159.
67. Hippuris vulgaris L. 162.
68. Hypericum attenuatum Chois. 150.
69. „ elegans Steph. 150.
70. Inula britannica L. 173.
71. Isopyrum fumarioides L. 81.
72. Juniperus nana Willd. 3.
73. „ Sabina L. 69.
74. Lamium album L. 17.
75. Lappa major Gärtn. 131.
76. „ tomentosa Lam. 131.
77. Lathyrus tuberosus L. 107.
78. Ledum palustre L. 5.
79. Lithospermum officinale L. 22.
80. Libanotis sibirica L. 28.
81. Lycoperdon spec.? 123.
82. Lycopodium annotinum L. 32, 168, 116.
83. „ complanatum L. 49.
84. Lysimachia vulgaris L. 111.
85. Lythrum salicaria L. 110.
86. „ virgatum L. 110.
87. Matricaria chamomilla L. 129.
88. Melilotus alba Lam. 34.
89. „ dentata Pers. 34.
90. Menyanthes trifoliata L. 155.
91. Mentha crispata Schr. 94.
92. „ piperita L. 95.
93. Nepeta lavandulacea L. f. 36.
94. „ macrantha L. 93.
95. „ nuda L. 37.
96. Origanum vulgare L. 35.
97. Oxycoccos palustris Pers. 67.

98. Oxytropis pilosa DC. 101.
99. Paeonia anomala L. 87.
100. Papaver somniferum L. 84.
101. Parmelia spec.? 8.
102. Parnassia palustris L. 16, 124.
103. Pedicularis comosa Ehr. 100.
104. Phlomis tuberosa L. 52.
105. Pinus pichta Led. 108.
106. „ sylvestris L. 151.
107. Plantago major L. 114.
108. Polygonum aviculare L. 24, 135.
109. „ Bistorta L. 83.
110. Polygonatum officinale All. 29, 54.
111. Polypodium vulgare L. 63.
112. „ Dryopteris L. 167.
113. Polyporus officinalis Fr. 186.
114. „ fomentarius Fr. 171.
115. „ igniarius Fr. 171.
116. Potentilla anserina L. 134.
117. „ bifurca L. 122.
118. „ pensylvanica L. 31.
119. „ viscosa Don. 41, 160.
120. Primula elatior Jacq. 42.
121. „ officinalis L. 42.
122. Prunus Padus L. 176.
123. Pulmonaria mollis Wolff. 154.
124. Rhamnus Frangula L. 75.
125. Rheum Rhaponticum L. 128.
126. Rhinanthus Crista galli L. 47, 92, 96.
127. Rhododendron chrysanthum Pall. 64.
128. Ribes nigrum L. 143.
129. Rosa Gmelini Bunge. 183.
130. „ cinnamomea L. 183.
131. Rubus idaeus L. 85.
132. „ saxatilis L. 57, 69.
133. Rumex acetosa L. 161.
134. Salices diversae 127.
135. Sambucus racemosa L. 13.
136. Sanguisorba officinalis L. 179.
137. Saussurea discolor DC. 102.
138. Saxifraga crassifolia L. 6.
139. Scabiosa ochroleuca L. 89, 106.
140. Scorzonera austriaca Willd. 153.
141. Scutellaria scordiifolia Fisch. 4.
142. Sedum hybridum L. 165.
143. „ purpureum Link. 43, 45, 115.
144. Senecio campestris DC. 56.
145. Serratula coronata L. 138.
146. Sinapis arvensis L. 27.
147. Solidago Virga aurea L. 136.
148. Solanum persicum Willd. 144.
149. Spiraea Ulmaria L. 15.
150. Statice Gmelini Willd. 146.
151. „ speciosa L. 147.
152. Sticta pulmonaria L. 44, 79.

153. Struthiopteris germanica Willd. 104.
154. Tanacetum vulgare L. 30.
155. Teloxys aristata Moq. Tand. 73.
156. Thalictrum minus L. 25.
157. Thymus serpyllum L. 9.
158. Tragopogon orientalis L. 68, 88.
159. Trifolium pratense L. 72.
160. Trollius asiaticus L. 40.
161. Umbilicus spinosus DC. 158.
162. Urtica cannabina L. 70, 133.
163. „ dioica L. 70.
164. „ urens L. 71.
165. Vaccinium Myrtillus L. 177.
166. Valeriana dubia Bge. 50.
167. „ officinalis L. 50.
168. Veratrum album L. 76, 172.
169. „ nigrum L. 172.
170. Verbascum Thapsus L. 60, 169.
171. Veronica Anagallis L. 123.
172. „ austriaca L. 53.
173. „ Beccabunga L. 123.
174. „ incana L. 125.
175. „ longifolia L. 140.
176. Viburnum Opulus L. 59.

VI. Общеупотребительныя народно-медицинскія средства, пріобрѣтаемыя изъ аптекъ и лавокъ.

1. *Александрійскій листъ* (Folia Sennae) пьютъ при запорахъ.

2. *Арника* (Flores arnicae). Любимое лѣчебное средство у латышей, изъ колоніи „Верхняя Буланка“ и друг. мѣстностей округа, отъ „сердца“.

3. *Бузина* (Flores Sambuci), пьютъ какъ потогонное.

4. *Вытяжной пластырь* (Emplastrum gummosum) отъ вередовъ.

5. *Бабковая мазь* (Ol. Lauri, Unguentum laurin). Отъ пупочной грыжи у дѣтей, смазываютъ пупокъ и даютъ внутрь.

6. *Гофманскія капли*, у латышей и эстовъ „Ликворъ“ (Spiritus aethereus). Отъ боли желудка, „сердца“. Любимое средство латышей.

7. *Деревянное масло* (Ol. olivar. viride). Употребляется для приготовленія мазей съ карболкой, воскомъ (спускъ) и нашатырнымъ спиртомъ (летучая мазь).

8. *Дорогая трава* (Rad. sarsaparillae). Отъ дурной боли, настаиваютъ на винѣ $^1/_4$ ф. на $^1/_4$ ведра. Пьютъ рюмками.

9. *Живое серебро, ртуть* (Hydrargyrum). Въ смѣшеніи съ саломъ — для мазей, съ крѣпкой водкой (acid. nitricum)—для приготовленія состава отъ дурной боли (сифилиса).

10. *Заживной пластырь, живучій пластырь* (Emplastrum Meliloti). Для заживленія ранъ.

11. *Іодъ* (Tinct. Jodi). Средство, вошедшее во всеобщее употребленіе въ послѣдніе годы. Отъ ломоты.

12. *Имбирь* (Rhizoma Zingiberis). Толченый имбирь пьютъ съ виномъ отъ боли живота.

13. *Калганъ* (Rhizoma Galangae). Употребляется также, какъ и имбирь.

14. *Карболка бѣлая и черная* (Acidum carbolicum crystallisatum et ac. carbol. crudum.). Вошла въ употребленіе въ послѣдніе годы. Бѣлую въ смѣси съ деревяннымъ масломъ употребляютъ для заживленія ранъ у людей и животныхъ; черная идетъ на лѣченіе овецъ отъ паршей и для лѣченія скота.

15. *Касторовое масло, проносное масло.* Употребляется какъ слабительное.

16. *Квасцы* (Alumen crudum). Въ растворѣ употребляются для полосканія; пережженные для присыпки отъ дикаго мяса.

17. *Киль бальзамъ*, киндеръ-бальзамъ (Spiritus aromaticus). Употребляется каплями внутрь отъ „подъему“, отчего иногда называютъ подъемными каплями.

18. *Крымза* (Zinc. sulfuricum). Въ видѣ слабаго раствора въ водѣ употребляютъ какъ глазную примочку.

19. *Крѣпкая водка, острая водка* (Acidum nitricum, иногда и Acidum muriaticum). Употребляется для приготовленія состава съ ртутью и сама по себѣ принимается внутрь по каплямъ отъ „сердца“. Изрѣдка крѣпкая водка употребляется для втиранія отъ сильной ломоты, но самое втираніе дѣлается въ банѣ, въ сильномъ пару. Употребляютъ для выжиганія бородавокъ и при лѣченіи скота.

20. *Купоросное масло* (Acidum sulfuricum). Употребляется незначительно при лѣченіи скота, для прижиганій.

21. *Липовый цвѣтъ* (Flores tiliae). Въ видѣ настоя и отвара, какъ потогонное и отъ кашля.

22. *Листовое золото* (поталь—листовая бронза). Пьютъ съ водой отъ золотухи.

23. *Мятныя капли и лепешки* (Tinct. et Rotulae Menthae piperitae). Принимаются отъ кашля, боли живота и другихъ болѣзней.

24. *Мушка* (Emplastr. cantharid.). Намазанную прикладываютъ къ шеѣ отъ головной боли. Цѣльныя сухія мушки (Lytta vesicatoria) употребляются внутрь, какъ возбуждающее.

25. *Нашатырь* (Ammon. chlorat.). Наскобленный нашатырь пьютъ съ водкой отъ боли желудка, „сердца“.

26. *Нюхательный спиртъ* (Ammonia liquida). Нюхаютъ отъ головной боли, отъ угара, въ смѣси съ деревяннымъ масломъ употребляютъ какъ втираніе отъ ломоты.

27. *Политанъ* (Unguentum pediculorum.). Отъ вшей у людей и животныхъ.

28. *Ревень, ревунъ корень* (Rad. rhei, chinae). Употребляется отъ дѣтской грыжи внутрь въ видѣ порошка, взрослымъ отъ боли живота.

29. *Ромашка* (Flores chamomillae). Пьютъ отъ кашля, боли живота. Употребляется также и для дѣтей.

30. *Сабуръ* (Aloë Soccotrina Lamarck.). Употребляютъ какъ слабительное для людей и скота.

31. *Сахаръ леденецъ* (Saccharum album). Употребляется въ видѣ порошка для вдуванія въ больной глазъ.

32. *Свинцовый сахаръ* (Plumbum aceticum). Служитъ для приготовленія свинцовой примочки, употребляемой отъ ушибовъ, при глазныхъ болѣзняхъ и для заживленія ранъ.

33. *Скипидаръ* (Ol. Terebinthinae). Принимаютъ внутрь отъ лихорадки, какъ наружное для втиранія отъ ломоты и другихъ болѣзней.

34. *Слабительная соль* (Natrum sulfuricum). Употребляется людьми и для скота.

35. *Сода* (Natrum bicarbonicum). Употребляется отъ изжоги.

36. *Сулема* (Hydrargyrum bichloratum corrosivum). Употребляется внутрь отъ дурной боли и для лѣченія скота, для приготовленія „клади“.

37. *Сѣра горючая и сѣрный цвѣтъ* (Sulfur sublimatum). Употребляется отъ золотухи. Пьютъ съ водой. Также употребляется при лѣченіи скота.

38. *Гайфель-дрекъ* (Teufelsdreck) Латышей. (Gummi-resina [illegible]sa foetida). Весьма употребительное средство для лѣченія скота, [illegible]имъ окуриваютъ и даютъ внутрь.

39. *Топиланъ* (Сойотское). Корневище китайскаго растенія [illegible]ilax Chinae), извѣстное въ медицинѣ, какъ Radix Chinae [illegible]dosa. Средство это въ большомъ употребленіи у Сойотъ, откуда [illegible]но проникло и въ Минусинскій округъ, употребляется вмѣсто до[illegible]гой травы, отъ дурной боли.

40. *Уксусъ* (Acetum). Употребляется для примочекъ отъ головной боли.

41. *Хина* (Chininum sulfuricum). Общеизвѣстное средство отъ лихорадки, которую не называютъ этимъ именемъ, а чаще всего „весновой“, „комухой“, „сусѣдкой“.

42. *Цитварное или цицарское сѣмя* (Flores [illegible]cinae). Употребляется отъ глистовъ.

43. *Чечилибуха* (Semina strychni). Настаиваютъ на водкѣ и пьютъ отъ „сердца“ (боли желудка).

44. *Чистотѣлъ* или мазь отъ почесухи (Ungu. contra Scabiem).

45. *Шалфей* (Herba salviae). Пьютъ отъ кашля, отъ дурной боли одинъ или въ смѣси съ исландскимъ мохомъ и липовымъ цвѣтомъ.

46. *Шафранъ* (Crocus orientalis). Употребляютъ женщины,

въ случаѣ задержанія мѣсячнаго.

Изъ сочиненій по народной медицинѣ въ библіотекѣ Музея имѣются слѣдующія:

Анненковъ. Ботаническій словарь. СПБ. 1878.

Горницкій. Замѣтки объ употребленіи въ народномъ быту нѣкоторыхъ дикорастущихъ и разводимыхъ растеній Украинской флоры. Харьковъ. 1887 г. (Труды Харьковск. Общ. Испытателей Природы).

Крыловъ. О народныхъ лѣкарственныхъ растеніяхъ, употребляемыхъ въ Пермской губ. Казань. 1876 г.

Его-же. Народныя лѣкарственныя растенія, употребляемыя въ Казанской губерніи. Казань. 1882 г.

Крутовскій. Artemisia frigida въ медицинскомъ отношеніи. Отчетъ Общ. Врачей Енисейской губ. 1886—1887 г. г. Стр. 61.

Его же. Матеріалы къ изученію способовъ народнаго врачеванія въ Восточной Сибири. Красноярскъ. 1891. (Отчетъ Общ. врачей Енисейск. губ. за $18^{90}/_{91}$ г.).

Слюнинъ. Матеріалы для изученія народной медицины въ Россіи. СПБ. 1882 г.

Его же. Медицинскій отдѣлъ на Всероссійской выставкѣ въ Москвѣ 1882 г. „Международная Клиника", № 9 1882 г.

Словцовъ. Матеріалы для фитографіи Тобольской губ. Омскъ. 1891 г.

Талько-Грынцевичъ. Народное акушерство въ южной Россіи. Черниговъ, 1889 г.

Флоринскій. Русскіе простонародные травники и лѣчебники. Казань. 1880 г.

Палласъ. Описаніе растеній Росс. Государства. СПБ. 1786 г.

Кривошапкинъ. Енис. округъ и его жизнь. СПБ. 1866 г.

Ордынскій. Цѣлебныя растенія въ Сибири. „Сибирская Газета". 1888 г. №№ 40 и 51.

Памятная книжка Енисейской губ. за 1863 г.

~~18389~~ 21866

Замѣченныя опечатки.

Стран.	Стр.	Напечатано.	Должно быть.
6	2.	arveusis	arvensis
9	13.	Детлова	Дѣтлова
14	21.	Таскино	Таскина
17	17.	Artemis absintium	Artemisia Absinthium
24	3.	Кидренское	Идринское
	10.	Означенное	Означенная
27	12.	теста	тѣста
30	10.	Патрошиловой	Потрошиловой
	21.	тоже	тоже
31	22.	сера	Сера
	25.	bursa	Bursa

Во всемъ изданіи мѣстныя названія болѣзней: нутро, рѣзачка, хомутъ, изломъ, грыжа и т. п. отпечатаны безъ кавычекъ.

Дополненіе:

29 16. Должна быть сноска: «Труды Сибирской Экспедиціи. Математическій отдѣлъ». СПБ. 1864 г.

Росси. Тюрантовъ, 1889 г.

Флоринскій. Русскіе простонародные травники и лѣчебники. Казань. 1880 г.

Палласъ. Описаніе растеній Росс. Государства. СПБ. 1786 г.

Кривошапкинъ. Енис. округъ и его жизнь. СПБ. 1866 г.

Ордынскій. Цѣлебныя растенія въ Сибири. „Сибирская Газета". 1888 г. №№ 40 и 51.

Памятная книжка Енисейской губ. за 1863 г.

БИБЛИОТЕКА

~~18389~~ 21866